

СОСТАВ:

сухой сироп глюкозы, рафинированные растительные масла (высокоолеиновое подсолнечное масло, кокосовое масло, рапсовое масло, подсолнечное масло), L-аргинина L-аспарат, L-лейцин, L-лизина ацетат, L-глутамин, L-пролин, эмульгатор (E472c), L-валин, глицин, L-изолейцин, дикалия гидроортофосфат (калиевые соли ортофосфорной кислоты), L-треонин, L-фенилаланин, L-тирозин, L-серин, L-гистидин, L-аланин, кальция фосфат двухосновный (кальциевые соли ортофосфорной кислоты), трикалий цитрат, натрия хлорид, кальция карбонат, холина битартрат, L-цистин, кальция глицерофосфат, L-триптофан, кальция цитрат, магния хлорид, масло из *Cryptocodinium cohnii*, L-метионин, кальция фосфат трехосновный, масло из *Mortierella alpina*, магния L-аспарат, инозитол, L-аскорбиновая кислота, антиокислители (лецитины(подсолнечный), аскорбилпальмитат), таурин, железа сульфат, цинка сульфат, L-карнитин, DL- α -токоферола ацетат, уридина 5'-монофосфат натриевая соль, цитидина 5'-монофосфат, никотинамид, D-пантотенат кальция, инозина 5'-монофосфат натриевая соль, аденозина 5'-монофосфат, гуанозина 5'-монофосфат натриевая соль, меди сульфат, тиамин мононитрат, рибофлавин, пиридоксин гидрохлорид, ретинола ацетат, калия йодид, марганца сульфат, фолиевая кислота, фитоменадион, натрия селенит, хрома хлорид, натрия молибдат, D-биотин, холекальциферол, цианокобаламин.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ НА 100 МЛ (ПРИ РАЗВЕДЕНИИ 13.5%)

Энергетическая ценность	67 ккал/278 кДж
Жиры,	3.5 г
из которых	
-насыщенные	1.3 г
-мононенасыщенные	1.5 г
-полиненасыщенные	0.56 г
из которых	
Линолевая кислота	453 мг
α-Линоленовая кислота	45.6 мг
Арахидоновая кислота	16.6 мг
Докозагексаеновая кислота	16.6 мг
Углеводы,	7.1 г
из которых	
сахаров	0.62 г
пищевые волокна	0 г
Белковый эквивалент	1.8 г
Соль	0.07 г
Витамины	
Витамин А	58.2 мкг RE/ER
Витамин D3	1.6 мкг
Витамин Е	1.48 мг (1.33 мг α-TE/ET)
Витамин С	7.11 мг
Витамин К	6.0 мкг
Тиамин	0.08 мг
Рибофлавин	0.08 мг
Ниацин	0.55 мг (1.27 мг NE/EN)
Витамин В6	0.06 мг
Фолиевая кислота	9.24 мкг

Фолаты	15.4 мкг
Витамин В12	0.19 мкг
Биотин	2.59 мкг
Пантотеновая кислота	0.41 мг
Минералы и микроэлементы	
Натрий	29.3 мг
Калий	72.9 мг
Хлориды	53.0 мг
Кальций	77.1 мг
Фосфор	50.2 мг
Магний	7.01 мг
Железо	1.0 мг
Медь	0.057 мг
Цинк	0.73 мг
Марганец	0.007 мг
Йод	14.0 мкг
Молибден	1.53 мкг
Селен	2.53 мкг
Хром	1.46 мкг
Другие	
Нуклеотиды	2.33 мг
L-карнитин	1.33 мг
таурин	4.32 мг
Инозитол	14.9 мг
Холин	18.5 мг
Осмолярность	310 мОсм/л
Осмоляльность	340 мОсм/кг H ₂ O

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ



1 Тщательно вымойте руки и подготовьте пространство для приготовления смеси. Простерилизуйте бутылочки и соски.



2 Вскипятите воду в течение 5 минут или до выключения электрического чайника. Дайте воде остыть в течение минимум 30 минут. Проверьте температуру воды, капнув несколько капель на запястье. Влейте необходимое количество воды в простерилизованную бутылочку.



3 Наполните прилагаемую мерную ложку и удалите горку сухой смеси сухим чистым ножом. Не спрессовывайте сухую смесь в ложке. Используйте только прилагаемую мерную ложку.



4 Добавьте необходимое количество ложек сухой смеси в воду. Закройте бутылочку крышкой и встряхните до полного растворения смеси. Перед применением убедитесь, что готовая смесь нужной температуры, капнув несколько капель на запястье.



5 Остатки готовой смеси подлежат утилизации через час после приготовления. Повторное подогревание запрещено.

Здоровье вашего ребенка зависит от тщательного соблюдения инструкций по приготовлению и применению продукта. Неправильное приготовление может вызвать побочные реакции.

ТАБЛИЦА КОРМЛЕНИЯ

(если нет других предписаний специалиста)

С рождения 3,5 кг	 3 +  90 мл	6 – 7 кормлений в сутки
2 недели 4 кг	 4 +  120 мл	6 кормлений в сутки
2 месяца 5,5 кг	 5 +  150 мл	5 – 6 кормлений в сутки
3 месяца 6 кг	 6 +  180 мл	5 кормлений в сутки
5 месяцев 7,5 кг	 7 +  210 мл	4 – 5 кормлений в сутки
7 месяцев 8,5 кг	 7 +  210 мл	4 кормлений в сутки
С 10 месяцев 9 кг	 8 +  240 мл	4 кормлений в сутки

100 мл смеси = 90 мл воды + 3 мерные ложки сухой смеси

1 мерная ложка = 4,5 г сухой смеси

Ребенку может потребоваться схема кормления, отличная от приведенной в таблице. Ввод в рацион ребенка других пищевых продуктов должен производиться только под руководством специалиста, при этом количество смеси может быть уменьшено соответственно. Количество продукта и схема разведения должны определяться только специалистом и зависят от возраста, массы тела и клинического состояния пациента.