

Таблица 1. Рекомендации по дозированию препарат Ропивакаин Каби для взрослых и детей старше 12 лет

	Концентрация препарата(мг/мл)	Объем раствора (мл)	Доза (мг)	Начало действия (мин)	Длительность действия (ч)
Анестезин при хирургических вмешательствах:					
Эпидуральная анестезия на поясничном уровне:					
Хирургические вмешательства	7.5	15-25	113-188	10-20	3-5
	10	15-20	150-200	10-20	4-6
Кесарево сечение	7.5	15-20	113-150 ¹	10-20	3-5
Эпидуральная анестезия на грудном уровне					
Послеоперационная обезболивающая блокада и хирургические вмешательства	7.5	5-15	38-113	10-20	н/д ²
Блокада крупных нервных сплетений					
Например, блокада плечевого сплетения*	7.5	30-40	225-300	10-25	6-10
Проводниковая и инфильтрационная анестезия	7.5	1-30	7.5-225	1-15	2-6
Купирование острого болевого синдрома					
Эпидуральное введение на поясничном уровне					
Болюс	2.0	10-20	20-40	10-15	0.5-1.5
Периодическое введение (например, при обезболивании родов)	2.0	10-15 (минимальный интервал 30 мин)	20-30		
Продленная инфузия для:					
обезболивание родов	2.0	6-10 мл/ч	12-20 мг/ч	н/д	н/д
послеоперационного обезбоживания	2.0	6-14 мл/ч	12-28 мг/ч	н/д	н/д
Блокада периферических нервов					
Например, блокада бедренного нерва или межлестничная	2.0	5-10 мл/ч	10-20 мг/ч	н/д	н/д

блокада (продленные инфузии или повторные инъекции)					
Эпидуральное введение на грудном уровне					
Продленная инфузия (например, для послеоперационного обезболивания)	2.0	6-14 мл/ч	12-28 мг/ч	н/д	н/д
Проводниковая блокада и инфльтрационная анестезия	2.0	1-100 мл/ч	2-200	1-5	2-6
Внутрисуставное введение					
Артроскопия коленного сустава**	7.5	20	150***	н/д	2-6

* Дозировка для проводниковой анестезии должна уточняться в соответствии с местом применения и состоянием пациента. Лестничная и надключичная блокады плечевого сплетения могут приводить к более высокой частоте появления побочных реакции, независимо от применяемого местного анестетика.

** Сообщалось о случаях хондролита при послеоперационной продленной внутрисуставной инфузии местных анестетиков. Ропивакаин Каби не следует применять для длительного внутрисуставного введения.

*** Если Ропивакаин Каби дополнительно применялся для других видов анестезии, максимальная доза не должна превышать 225 мг.

¹ - Должно использоваться пошаговое дозирование, начальная доза около 100 мг (97.55 мг=13 мл, 105 мг=14 мл) и вводится в течение 3-5 мин. Две дополнительные дозы, суммарно дополнительно 50 мг, могут быть введены при необходимости.

² - Н/д = не действительно.

Таблица 2. Рекомендации по дозированию препарата Ропивакаин Каби для детей от 0 до 12 лет

Концентрация	мг/мл	Объем мг/кг	Доза мг/кг
Купирование острого болевого синдрома (пред- и послеоперационное обезболивание)			
Каудальное эпидуральное введение	2.0	1	2
Блокады ниже T ₁₂ . у детей с массой тела до 25 кг			
Продленная эпидуральная инфузия у детей с массой тела до 25 кг			
<i>Возраст от 0 до 6 месяцев</i>			
Болюсное введение ^а	2.0	0.5-1	1-2
Инфузия до 72 ч	2.0	0.1 мл/кг/ч	0.2 мл/кг/ч
<i>Возраст от 6 до 12 месяцев</i>			
Болюсное введение ^а	2.0	0.5-1	1-2
Инфузия до 72 ч	2.0	0.2 мл/кг/ч	0.4 мл/кг/ч

<i>Возраст от 1 до 12 лет включительно</i>			
Болюсное введение ^б	2.0	1	2
Инфузия до 72 ч	2.0	0.2 мл/кг/ч	0.4 мл/кг/ч

^а - Меньшие дозы из предлагаемого интервала дозирования рекомендуются для торакальной и эпидуральной блокад, тогда как большие - для люмбальных и каудальных эпидуральных блокад.

^б - Рекомендуется для люмбальных эпидуральных блокад. Обоснованным является снижение болюсной дозы в случае анальгезии на грудном уровне.