Лекарственная форма с указанием наименований и количественного содержания

Объем мешка	**1206 мл**	**1448 мл**	**1904 мл**
Аминокислотный раствор	380 мл	456 мл	600 мл
Декстроза 13%	656 мл	788 мл	1036 мл
Жировая эмульсия	170 мл	204 мл	268 мл
Энергетическая ценность	800 ккал	1000 ккал	1300 ккал

Состав: после смешивания 3-х камер:	**1206 мл**	**1448 мл**	**1904 мл**	**1000 мл**
Активные компоненты				
L-аланин	5,3 г	6,4 г	8,4 г	4,4 г
L-аргинин	4,6 г	5,5 г	7,2 г	3,8 г
Глицин	4,2 г	5,1 г	6,6 г	3,5 г
L- гистидин	1,1 г	1,3 г	1,8 г	0,93 г
L-изолейцин	1,9 г	2,3 г	3,0 г	1,6 г
L-лейцин	2,8 г	3,3 г	4,4 г	2,3 г
L-лизин (в виде лизина ацетата)	2,5 г	3,0 г	4,0 г	2,1 г
L-метионин	1,6 г	1,9 г	2,6 г	1,3 г
L-фенилаланин	1,9 г	2,3 г	3,1 г	1,6 г
L-пролин	4,2 г	5,1 г	6,7 г	3,5 г
L-серин	2,5 г	3,0 г	3,9 г	2,1 г
Таурин	0,38 г	0,46 г	0,60 г	0,32 г
L-треонин	1,7 г	2,0 г	2,6 г	1,4 г
L-триптофан	0,76 г	0,91 г	1,2 г	0,63 г

(активности) фармацевтических субстанций и вспомогательных веществ

эмульсия для инфузий

СМОФКабивен® периферический выпускается в трехкамерном мешке и представлен в трех объемах.

Каждый мешок содержит следующие объемы растворов, в зависимости от размера мешка:

L-тирозин	0,15 г	0,17 г	0,24 г	0,12 г
L-валин	2,4 г	2,9 г	3,7 г	2,0 г
Кальция хлорид (в виде кальция хлорид дигидрата)	0,21 г	0,26 г	0,34 г	0,18 г
Натрия глицерофосфат (в виде натрия глицерофосфат гидрата)	1,6 г	1,9 г	2,5 г	1,3 г
Магния сульфат (в виде магния сульфат гептагидрата)	0,46 г	0,55 г	0,72 г	0,38 г
Калия хлорид	1,7 г	2,0 г	2,7 г	1,4 г
Натрия ацетат (в виде натрия ацетат тригидрата)	1,3 г	1,6 г	2,0 г	1,1 г
Цинка сульфат (в виде цинка сульфат гептагидрата)	0,005 г	0,006 г	0,008 г	0,004 г
Глюкозы (декстрозы) (в виде декстрозы моногидрата)	85 г	103 г	135 г	71 г
Соевых бобов масло очищенное	10,2 г	12,3 г	16,1 г	8,5 г
Триглицериды среднецепочные	10,2 г	12,3 г	16,1 г	8,5 г
Оливковое масло (рафинированное)	8,5 г	10,1 г	13,4 г	7,0 г
Рыбий жир (обогащенный омега-3 жирными кислотами)	5,1 г	6,1 г	8,0 г	4,2 г
Вспомогательные компоненты				
Глицерол	4,3 г	5,1 г	6,7 г	
фосфолипиды яичного желтка	2,0 г	2,4 г	3,2 г	
Натрия олеат	0,051 г	0,061 г	0,080 г	
Рацемическая смесь α-Токоферолов	27,7– 38,3 мг	33,3–45,9 мг	43,7–60,3 мг	
Натрия гидроксид (регулятор pH)	q.s.	q.s.	q.s.	
Кислота уксусная ледяная	q.s.	q.s.	q.s.	
Вода для инъекций	1206 мл	1448 мл	1904 мл	1000 мл

Что соответствует:

Углеводы				
декстроза (безводная)	85 г	103 г	135 г	71 г
аминокислоты	38 г	46 г	60 г	32 г
азот	6,2 г	7,4 г	9,8 г	5,1 г
жиры	34 г	41 г	54 г	28 г
Энергетическая ценность	800 ккал	1000 ккал	1300 ккал	700 ккал
Энергетическая ценность небелковая	700 ккал	800 ккал	1100 ккал	600 ккал

Электролиты				
- натрий	30 ммоль	36 ммоль	48 ммоль	25 ммоль
- калий	23 ммоль	28 ммоль	36 ммоль	19 ммоль
- магний	3,8 ммоль	4,6 ммоль	6,0ммоль	3,2 ммоль
- кальций	1,9 ммоль	2,3 ммоль	3,0 ммоль	1,6 ммоль
- фосфат	9,9 ммоль	11,9 ммоль	15,6 ммоль	8,2 ммоль
- цинк	0,03 ммоль	0,03 ммоль	0,05 ммоль	0,02 ммоль
- сульфат	3,8 ммоль	4,6 ммоль	6,1 ммоль	3,2 ммоль
- хлорид	27 ммоль	32 ммоль	42 ммоль	22 ммоль
- ацетат	79 ммоль	96 ммоль	125 ммоль	66 ммоль

Осмоляльность	около 950
мОсмоль/кг воды Теоретическая осмолярность	около 850
мОсмоль/л	
pH после смешивания	около 5,6

Описание: Декстроза 13% - прозрачный, бесцветный или с желтоватым оттенком раствор.

Раствор аминокислот – прозрачный, бесцветный или с желтоватым оттенком раствор. Жировая эмульсия - белая однородная эмульсия.

При смешивании содержимого трех камер – белая однородная эмульсия.